

Zika virus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Zika virus พบผู้ป่วย 433 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 17 ธค 67 จาก 46 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.65 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.33 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (25.64 %) 25-34 ปี (23.33 %) 45-54 ปี (14.78 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 89.1 อื่นๆร้อยละ 9.2 กัมพูชาร้อยละ 0.5 พม่าร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 66.7 รับจ้างร้อยละ 11.1 นักเรียนร้อยละ 10.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (54 ราย), 25-34 ปี (45 ราย), 45-54 ปี (40 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (27 ราย), 25-34 ปี (22 ราย), 15-24 ปี (15 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (15 ราย), 55-64 ปี (10 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (15 ราย), 55-64 ปี (8 ราย),

ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Zika virus cases by week of onset and region.
2567

