

Enterovirus Fever

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Enterovirus Fever พบผู้ป่วย 110 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 มิย 67 จาก 24 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.17 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.93 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (58.18 %) 7-9 ปี (14.55 %) 5 ปี (10.91 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.4 อื่นๆร้อยละ 1.8 ลาวร้อยละ 0.9 พม่าร้อยละ 0.9 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 73.6 นักเรียนร้อยละ 25.5 งานบ้านร้อยละ 0.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (13 ราย), 3 ปี (10 ราย), 4 ปี (8 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 6 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (1 ราย), 3 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (4 ราย), 5 ปี (4 ราย), 1 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (4 ราย), 2 ปี (3 ราย), 3 ปี (2 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.

2567

