

# Enterovirus Fever

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Enterovirus Fever พบผู้ป่วย 149 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 กค 67 จาก 29 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.23 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (61.07 %) 7-9 ปี (12.75 %) 5 ปี (10.07 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.0 อื่นๆร้อยละ 2.0 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.7 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 74.5 นักเรียนร้อยละ 24.2 งานบ้านร้อยละ 0.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (15 ราย), 3 ปี (14 ราย), 1 ปี (14 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 6 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (2 ราย), 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 5 ปี (5 ราย), 3 ปี (4 ราย), 1 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (6 ราย), 4 ปี (3 ราย), 2 ปี (3 ราย),




อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.

2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health