

## Enterovirus Fever

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Enterovirus Fever พบผู้ป่วย 377 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 15 พย 67 จาก 48 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.57 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.85 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (59.68 %) 7-9 ปี (13.79 %) 5 ปี (9.28 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 อื่นๆร้อยละ 1.9 พม่าร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.3 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 72.4 นักเรียนร้อยละ 26.3 ทหารร้อยละ 0.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (44 ราย), 3 ปี (39 ราย), 1 ปี (37 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (5 ราย), 6 ปี (4 ราย), 3 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (13 ราย), 1 ปี (11 ราย), 5 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (11 ราย), 2 ปี (5 ราย), 5 ปี (4 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.

2567

