

## โรคคอตีบ ( Diphtheria )

รายงานผู้ป่วยโรคคอตีบเพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่มีการรายงานในปี 2524 ในปีนี้มีรายงานผู้ป่วยทั้งหมดรวม 1125 ราย เสียชีวิต 71 ราย จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 42% เป็นผลมาจากการระบาดในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น นครราชสีมา สกลนคร กาฬสินธุ์ หนองคาย ร้อยเอ็ด เลย สุรินทร์และอุบลราชธานี จำนวนผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นถึง 141% จากปี 2524 ในขณะที่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคใต้ จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงโดยทั่วไป

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุของผู้ป่วยในปี 2525 เปรียบเทียบกับปี 2524 จะพบว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มอายุ 0-4 ปีที่ได้กำหนดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนดีทีพีอยู่แล้วและในกลุ่มอายุ 5-9 และ 10-14 ปี โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 5-9 ปีมีเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดและ 10-14 ปีรองลงมา ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าความครอบคลุมด้วยวัคซีนในเด็กกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดข้างต้นอาจจะยังไม่สูงพอ รวมทั้งมีแนวโน้มว่าจะพบโรคคอตีบได้ในกลุ่มอายุที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน จึงควรมีการพิจารณาให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมในเด็กที่อยู่ในวัยเรียนร่วมด้วยทั้งที่เป็นการกระตุ้นและทั้งกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับมาก่อน

<u>ผู้ป่วย โรคคอตีบ แยกตามกลุ่มอายุประเทศไทย 2524-2525</u>			
<u>กลุ่มอายุ</u>	<u>2524</u>	<u>2525</u>	<u>% ที่เพิ่มขึ้น</u>
0-4	468	635	35.7
5-9	243	380	56.4
10-14	73	102	39.7
15 ขึ้นไป	8	8	0