

คอตีบ (Diphtheria)

ในปีนี้มีรายงานผู้ป่วยคอตีบรวมทั้งหมด 1,038 ราย เสียชีวิต 74 ราย (อัตราตายต่อผู้ป่วย 7 %) ลดลง 8 % จากจำนวนผู้ป่วยในปีที่แล้ว จำนวนผู้ป่วยในปีที่แล้ว จำนวนผู้ป่วยลดลงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในขณะที่เพิ่มเล็กน้อยในภาคกลางและภาคเหนือ มีอยู่ 2 จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบเลยในปี 2526 คือ สิงห์บุรีและ ระนอง

ตั้งแต่ปี 2525 เป็นต้นมา งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มจำนวนวัคซีนดีพีทีในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี จาก 2 เป็น 3 โด๊ส ในขณะที่เดียวกันได้เริ่มดำเนินการให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมสำหรับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนร่วมด้วย โดยกำหนดให้วัคซีนดีพีที 2 โด๊สในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลสำคัญว่ามีแนวโน้มที่จะพบโรคคอตีบได้มากขึ้นในกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบการกระจายตามกลุ่มอายุของผู้ป่วยคอตีบในปี 2524 และ 2526 การกระจายของผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 10 ปีขึ้นไปในปี 2526 ยังคงมีเปอร์เซ็นต์สูง

อาจจะต้องใช้ระยะเวลาานานกว่านี้ในการติดตามดูผลกระทบของการให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมในเด็กวัยเรียน