

โรคคอตีบ (Diphtheria)

จากปี พ.ศ. 2520 – 2525 อัตราการเกิดโรคคอตีบลดลงจาก 5/100,000 เป็น 2/100,000 จากนั้นจึงเริ่มคงที่ ในปี พ.ศ. 2527 มีผู้ป่วย 1,021 ราย อัตราป่วยตาย 4.1% (42/1021) จำนวนผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เช่นทุกปี อัตราป่วยสูงสุดในภาคกลาง (2.2/100,000) ต่ำสุดภาคเหนือ (1.5/100,000)

อัตราการป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0 – 4 (8/100,000) โดยเฉพาะช่วงอายุ 1 ปี (10/100,000) และอัตราป่วยรองลงมาในกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (6/100,000) และ 10 – 14 ปี (3/100,000) ส่วนกลุ่มอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอัตราการเกิดน้อยที่สุด แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก (0.01/100,000) ในปี พ.ศ. 2527