

โรคคอตีบ (Diphtheria)

ในปี พ.ศ. 2528 มีรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบทั้งสิ้น 762 ราย นับเป็นอัตราป่วยที่ต่ำที่สุด นับตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมา ตาย 55 คน คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 7.2 (55/762) ซึ่งกลับสูงขึ้นมาอีกทั้งที่มีแนวโน้มลดติดต่อกันมา 5 ปี แต่ลักษณะการระบาดของโรคเป็นรายเดือนยังเหมือนกับทุกๆปี คือ ผู้ป่วยสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม อัตราป่วยเป็นรายภาคพบว่า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางมีแนวโน้มลดลง ทั้ง 3 ภาค ในขณะที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราป่วยเป็นรายจังหวัดก็พบว่าลดลงจากปีก่อนๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยทั่วไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราป่วยเป็นรายกลุ่มอายุในปีนี้มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มอายุ แต่ลักษณะที่ต่างไปจากปีก่อน คือ อัตราป่วยของเด็กที่มีอายุสูง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเด็กกลุ่มอายุนี้ได้รับการฉีดวัคซีน ในช่วงต้นของแผน Expanded Programme on Immunization (EPI) ในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งยังมีความครอบคลุมการให้วัคซีนต่ำ และในช่วงต้นของการให้ DT ในเด็กนักเรียน ซึ่งเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2525 ยังมีความครอบคลุมการให้วัคซีนไม่สูงพอ ดังนั้นเป้าหมายการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ขณะนี้ คือ เร่งความครอบคลุมของการให้วัคซีน DT ในเด็กนักเรียนให้ครอบคลุมสูงขึ้น