

## ไข้คอตีบ ( Diphtheria )

พ.ศ. 2529 มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคคอตีบจากทั่วประเทศ 632 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.20 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 42 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 6.7 การเกิดโรคมียัอัตรา แนวโน้มลดลง อัตราป่วยในกลุ่มอายุน้อยกว่า 15 ปี เป็นแนวโน้มลดลง แต่การเกิดโรคในกลุ่มอายุมากกว่า 14 ปี กลับมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อย จำนวนผู้ป่วยในกลุ่มอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นทุกปี พบผู้ป่วยได้ตลอดปี แต่พบผู้ป่วยมาก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม อัตราป่วยจำแนกตามภาค พบว่าอัตราป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคเหนือ ตามลำดับ ในปีนี้ไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้คอตีบจาก 12 จังหวัด คือ ลำพูน น่าน แพร่ พิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ระยอง สตูล และ นราธิวาส

จังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราป่วยมากที่สุดคือ 7.7 ต่อประชากรแสนคน เนื่องจากมีการระบาดของไข้คอตีบระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2529 ใน 14 อำเภอ จากทั้งหมด 19 อำเภอและ 3 กิ่งอำเภอ อัตราป่วยมากที่สุดในอำเภอม่วงสามสิบ รองลงมา คืออำเภอเมือง นอกจากนี้ยังมีรายงานการระบาดในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดร้อยเอ็ด

จากข้อมูลการเฝ้าระวังไข้คอตีบ มีข้อที่น่าสังเกตดังนี้

1. อัตราป่วยในกลุ่มอายุ 5 – 9 และ 10 – 14 ปี มีการลดลงช้ากว่าอัตราป่วยในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี
2. ผู้ป่วยไข้คอตีบในกลุ่มอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้น นอกจากจะเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปีแล้ว สมควรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันโรค ให้ครอบคลุมอย่างครบถ้วนในกลุ่มวัยเด็กเรียนด้วย