

ไข้คอตีบ (Diphtheria)

ใน พ.ศ. 2530 มีผู้ป่วยไข้คอตีบที่รายงานเข้ามายังกองระบาดวิทยาทั้งหมด 536 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1.00 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 51 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 6.5 อัตราป่วยตั้งแต่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา มีแนวโน้มลดลงอย่างสม่ำเสมอ แต่อัตราป่วยตายยังคงค่อนข้างคงที่ จำนวนผู้ป่วยรายเดือนพบสูงในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน โดยพบสูงสุดเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม อัตราการเกิดโรคในกลุ่มอายุต่าง ๆ พบว่าในกลุ่มอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อยู่ในอัตราที่ต่ำ ส่วนในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี และ 5 - 9 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างสม่ำเสมอ อัตราป่วยเป็นรายภาค ไม่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน และมีลักษณะลดลงในทุกภาค ยกเว้นภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่า อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุดเช่นเดียวกับปี 2529 คือ 3.9 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา และมหาสารคาม มีอัตราป่วย 3.09 และ 2.97 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ จังหวัดอื่นนอกจากนั้นมีอัตราป่วยขั้นต่ำกว่า 2.4 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้คอตีบเลย มี 7 จังหวัด คือ พะเยา, สิงห์บุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี, พังงา, ยะลา และนราธิวาส