

ไข้คอติบ (Diphtheria)

ในปี 2533 มีรายงานผู้ป่วยไข้คอติบทั่วประเทศ จำนวน 58 ราย จาก 28 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.1 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 15.5 อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลงอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี 2525 ที่อัตราป่วยตายมรแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา รายงานจำนวนผู้ป่วยตามรายเดือนพบสูงสุดในเดือนกรกฎาคม อัตราป่วยในกลุ่มอายุต่างๆ มีแนวโน้มลดลงทุกกลุ่มอายุ อัตราป่วยเป็นรายภาค พบว่าภาคใต้มีอัตราป่วยสูงกว่าภาคอื่นๆ คือ 0.34 ต่อประชากรแสนคน เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัดพบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด (1.17 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี และนราธิวาส มีอัตราป่วย 0.92 และ 0.89 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้คอติบเลยมี 45 จังหวัด ซึ่งต่างกับปี 2530 ซึ่งมีจำนวน 7 จังหวัด ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยไข้คอติบเลย

ในปี 2533 มีอัตราการครอบคลุมของวัคซีนป้องกันไข้คอติบครบ 3 เข็มในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เท่ากับ 85.12% และกระตุ้นในเด็กวัยเรียนได้ 89.40%