

ไข้อยคตบ (Diphtheria)

ในปปี 2535 กองระบาควทยาไ้รับรายงานผู้ป่วยไข้อยคตบท้ทั่วประเทศจ้ำนวน 40 ราย คบคเป็น อัตราป่วย 0.069 ต้อประชากรแสนคน จากข้อมูล 10 ปปีย้อนหลังพบว้แนวโน้มของโรคลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต้ปี 2526 ถึง 2532 จากนั้นค้อยๆ ลดลงจนถึงปี 2535 มีผู้เสียชีวิต 7 ราย คบคเป็นอัตราป่วยตตาย 0.012 ต้อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตตาย ร้อยละ 17.5 (7/40) ลดลงจากปี 2534 ที่มีอัตราป่วยตตายสูงสุดถึงร้อยละ 20.8

จากรายงานเมื่อจ้ำนกผู้ป่วยตามรายเดือนพบผู้ป่วยสูงสุดในช่วงฤดูฝน ประมาณ เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม รองลงมาคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

เมื่อจ้ำนกผู้ป่วยตามกลุ่มอายุพบผู้ป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี คบคเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 0.28 ต้อประชากรแสนคน รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5 – 9 ปี อัตราป่วยป่วยเท่ากับ 0.24 ต้อประชากรแสนคน พบผู้ป่วยเพียง 1 ราย ในกลุ่มอายุมากกว่า 15 ปี

การกระจายของผู้ป่วยตามรายภาคพบว้ ภาคใต้มีอัตราป่วยสูงสุด 0.24 ต้อประชากรแสนคน รองลงมาคือภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วยเท่ากับ 0.059 และ 0.055 ต้อประชากรแสนคนตามลำดับ ภาคเหนือ ไม่พบผู้ป่วย เมื่อพิจารณาเป็นรายจังหวัด พบว้จังหวัดระนองมีอัตราป่วยสูงสุดเท่ากับ 0.76 ต้อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ สุพรรณบุรี และพังงาน

ในปปี 2535 อัตราครอบคลุมของวัคซีนป้องกันไข้อยคตบ ไอกรน บาดทะยัก (DPT) ครบ 3 เข็มในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ท้ทั่วประเทศเท่ากับร้อยละ 84.67 และอัตราครอบคลุมของวัคซีนในเด็กชั้นประถมปีที่ 1 (DT) เท่ากับ ร้อยละ 75.34