

โรคคอตีบ (Diphtheria)

ปี พ.ศ. 2544 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคคอตีบ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย จาก 8 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 30.0 แนวโน้มอัตราป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2542 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ปี พ.ศ. 2543 – 2544 มีแนวโน้มลดลง

เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 5 – 9 ปี (0.11 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี (0.06 ต่อประชากรแสนคน) และกลุ่มอายุ 10 – 14 ปี (0.02 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ

ผู้ป่วยเพศหญิง 3 ราย เพศชาย 7 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อชาย เท่ากับ 1 : 2.3

การกระจายของโรคตามรายเดือน ในปี พ.ศ. 2544 พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน สิงหาคม 3 ราย รองลงมา เดือนเมษายนและพฤศจิกายน เดือนละ 2 ราย เดือนมกราคม, กรกฎาคม และ ธันวาคม เดือนละ 1 ราย ตามลำดับ

จังหวัดที่ได้รับรายงาน มีจำนวน 8 จังหวัด ดังนี้ ภาคกลาง 3 จังหวัด จำนวน 5 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด จำนวน 2 ราย ภาคเหนือ 1 จังหวัด จำนวน 1 ราย และภาคใต้ 1 จังหวัด จำนวน 1 ราย

ผู้ป่วยอยู่ในเขตเทศบาล 3 ราย (ร้อยละ 30) นอกเขตเทศบาล 7 ราย (ร้อยละ 70) เป็นผู้ป่วยใน 2 ราย (ร้อยละ 20) ผู้ป่วยนอก 8 ราย (ร้อยละ 80)

สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานสอบสวนโรค 3 ราย มีประวัติได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 ราย และไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีน 1 ราย