

โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

รายงานผู้ป่วยในปีนี้ 212 ราย ลดลงจาก 248 รายในปีที่แล้ว และลดลงต่ำที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ 209 รายเสียชีวิตในสถานพยาบาล อีก 3 ราย ญาตินำกลับมาชันสูตรที่โรงพยาบาล ขณะเดียวกันจากมรณะบัตร กระทรวงมหาดไทย รายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึง 339 ราย

มีการสอบสวนโรคผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ารวม 48 ราย จากทั้งหมด 212 ราย มีเพียง 9 รายได้รับการฉีดวัคซีน เข็มเปิด หลังจากถูกกัดและมีถึง 4 จาก 9 ราย ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มเปิด “ครบชุด” (14 หรือ 21 เข็ม) 47 รายให้ประวัติถูกสุนัขกัดก่อนป่วย อีก 1 รายไม่ทราบประวัติ ระยะฟักตัวของผู้ป่วยทั้ง 48 รายตั้งแต่ 9 วันถึง 1 ปี 6 เดือน ประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วง 1-3 เดือน ผู้ป่วย 30 จาก 48 ราย (62.5%) เสียชีวิตภายใน 3 วันหลังจากเริ่มมีอาการป่วย และ 44 จาก 48 ราย (92%) เสียชีวิตภายใน 1 สัปดาห์

ในปี 2524 มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มเปิด “ครบชุด” (14 หรือ 21 เข็ม) จากสถานบริการทั่วประเทศรวม 60,457 ราย เพิ่มขึ้นถึง 40% จาก 43,256 รายในปี 2523 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบชุดมีอีกจำนวนไม่น้อยซึ่งไม่มีตัวเลขรายงานไว้ แสดงว่าในแต่ละปีจะยังคงมีผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันมีหน่วยชันสูตรและสถาบันต่าง ๆ รวม 19 แห่งทั่วประเทศที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าได้ ในปีนี้ทั้ง 19 แห่งได้รับตัวอย่างส่งตรวจรวม 9,952 ตัวอย่างพบเชื้อไวรัสนี้ถึง 6,209 ตัวอย่าง (62.5%) ในจำนวนนี้เป็นหัวสุนัข 9,3219 ตัวอย่างตรวจพบเชื้อไวรัส 5,935 ตัวอย่าง (64.4%) และเป็นหัวแมว 587 ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อไวรัส 229 ตัวอย่าง (39%)