

Trichinosis

ได้รับรายงานว่าเกิดโรครวม 4 ครั้ง จาก 2 จังหวัด คือ น่าน ที่อำเภอปัว 1 ครั้ง และเชียงราย 3 ครั้ง ที่อำเภอเมือง 2 ครั้ง และอำเภอแม่สรวย 1 ครั้ง ซึ่งท้องที่ดังกล่าวแล้วมีโรคนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ สาเหตุการระบาดทั้ง 4 ครั้งนี้มาจากสุกรที่ชาวเขานำลงมาขาย มีผู้ป่วยทั้งหมด 153 ราย ไม่มีตาย เป็นชาย 108 คน หญิง 45 คน เป็นอัตราส่วนชายต่อหญิงประมาณ 2 : 1 ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15 – 44 ปี มีอาชีพทางการเกษตรเกือบทั้งหมด

เนื่องจากโรคทริคิโนซิส มีสาเหตุมาจากสุกรชาวเขา และสัตว์ป่าอีกหลายอย่างจึงยากต่อการควบคุม การป้องกันที่น่าจะได้ผลดีที่สุดคือ การให้การสุขศึกษาแก่ประชาชน ในการบริโภคอาหารที่สุกเพียงพอเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสุกรจากชาวเขาและเนื้อสัตว์ป่า แม้ว่าโรคนี้พบในประเทศไทยมาแล้วเกือบ 20 ปี แต่ก็ยังนับว่าโรคนี้ที่ไม่ระบาดลูกกลมลงมาในพื้นที่ราบมากนัก