

### **ทริคิโนสิส (Trichinosis)**

มีการรายงานการระบาดของโรคทริคิโนสิสในปีนี้มีรวม 3 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนในเดือนมกราคม (ผู้ป่วย 87 ราย) ครั้งต่อมาที่เพชรบูรณ์ในเดือนเมษายน (ผู้ป่วย 178 ราย) และที่น่านในเดือนธันวาคม (ผู้ป่วย 19 ราย) รวมรายงานผู้ป่วยทั้งหมด 284 ราย (ชาย 184 ราย, หญิง 100 ราย) และเสียชีวิต 12 ราย ผู้ป่วยมีประวัติบริโภคเนื้อหมูปรุงไม่สุกซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิ *Trichinella spiralis* ฝังตัวอยู่ก่อนมีอาการป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ (79%) มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคนี้อย่างคงคล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมา คือผู้ป่วยได้รับเชื้อจากการบริโภคเนื้อหมูที่เลี้ยงโดยชาวเขาโดยไม่ปรุงให้สุกดีเสียก่อน รายงานการระบาดยังคงจำกัดอยู่เฉพาะในภาคเหนือซึ่งน่าจะเป็น endemic area ของการติดเชื้อพยาธิตัวนี้ในหมู อัตราการตายต่อป่วยร้อยละนับแต่เริ่มรายงานยังคงคงที่ประมาณ 4% มาตลอด