

## โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)

ปี 2532 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคทริคิโนซิส จำนวน 242 คน ไม่มีตาย คิดเป็นอัตราป่วย 0.44 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยลดลงจากปี 2531 เล็กน้อย เป็นรายงานจากจังหวัดเชียงราย 178 คน เชียงใหม่ 56 คน แม่ฮ่องสอน 5 คน และชุมพร 3 คน ซึ่งเป็นรายงานครั้งแรกที่พบในภาคใต้ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงานคือ 15 – 34 ปี แยกเป็นเพศชาย 163 คน เพศหญิง 79 คน คิดเป็นอัตราส่วนชายต่อหญิง เท่ากับ 2.06 :1 ซึ่งก็คล้ายกับปีก่อนๆ

จากการสอบสวนทั้งระบาดวิทยา พบว่าในปี 2532 มีการระบาดของโรคทริคิโนซิส รวม 7 ครั้ง คือ

ที่จังหวัดเชียงราย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อ 10 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ ที่ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ และตำบลบัวสลี อำเภอเมือง มีผู้ป่วย 36 คน ครั้งที่ 2 เมื่อ 3 – 9 มิถุนายน ที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน มีผู้ป่วย 78 คน ครั้งที่ 3 เมื่อ 4 – 22 สิงหาคม ที่ตำบลสร้อย และตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย มีผู้ป่วย 64 คน การเกิดโรคทั้ง 3 ครั้ง สาเหตุมาจากการบริโภคเนื้อสุกรชาวเขา

จังหวัดเชียงใหม่มีการเกิดโรค 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ 16 เมษายน – 5 พฤษภาคม ที่ตำบลแม่สาย อำเภอสะเมิง มีผู้ป่วย 36 คน ครั้งที่ 2 เมื่อ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ที่ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง มีผู้ป่วย 20 คน ทั้งสองครั้งมีสาเหตุจากการบริโภคเนื้อสุกรชาวเขา

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่ามีการระบาดของโรคนี้เมื่อ 14 – 30 มิถุนายน ครั้งเดียวที่ตำบลปางหมู อำเภอเมือง มีผู้ป่วย 5 คน สาเหตุจากการบริโภคเนื้อสุกรชาวเขาเช่นกัน ทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว เคยมีการระบาดของโรคนี้เกือบทุกปี ตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้นมา

การระบาดครั้งสุดท้ายของปีนี้เมื่อ 24 กันยายน ที่ตำบลสลู อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร มีผู้ป่วย 3 คน สาเหตุมาจากการบริโภคเนื้อเต่าบก ซึ่งเป็นรายงานครั้งแรกของโรคทริคิโนซิสจากเต่าบก ตรวจพบโดยการทำ Muscle Biopsy ผู้ป่วยเมื่อปลายเดือนตุลาคม ที่โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังจากเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมาแล้วหลายแห่ง