

ทริคิโนซิส (Trichinosis)

ปี พ.ศ. 2535 กองระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคทริคิโนซิสจากบัตร รง. 506 จำนวน 397 ราย อัตราป่วย 0.69 ต่อประชากรแสนคน ตาย 1 ราย เป็นรายงานจากภาคเหนือ 311 ราย (ตาย 1 ราย) ภาคใต้ 84 ราย และภาคกลาง 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เป็นรายภาคเท่ากับ 0.66 , 2.66 และ 0.02 ตามลำดับ แยกเป็นเพศชาย 232 ราย เพศหญิง 165 ราย เป็นอัตราส่วนชาย : หญิง ประมาณ 1.5 : 1 อายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75) อยู่ในช่วง 15 – 44 ปี และเมื่อเทียบเป็นอัตราต่อแสนแล้ว พบว่าสูงมากใน 2 กลุ่มอายุ คือ 25 – 34 ปี และ 35 – 44 ปี คือ 39.45 และ 23.85 ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับปีก่อนๆ

จากการสอบสวนโรคพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 13 ราย และตายเพิ่มอีก 1 ราย สรุปแล้วแต่ละจังหวัดที่ผู้ป่วยดังนี้ คือ ภาคเหนือที่เชียงใหม่ 147 คน ที่หมู่ที่ 1 , 5 , 12 และ 15 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม สาเหตุมาจากหมูชาวเขาเป็นตัวพาหะนำโรค จังหวัดเชียงราย 102 ราย ที่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน (55 ราย ตาย 2 ราย) สาเหตุจากหมูชาวเขา ที่หมู่ที่ 7 ตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน (39 ราย) สาเหตุจากหมูชาวเขา และที่หมู่ที่ 5 ตำบลป่าซาง (22 ราย) สาเหตุจากหมูป่าจากฝั่งพม่า จังหวัดน่าน 44 ราย ที่หมู่ที่ 7 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง (5 ราย) และหมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา (40 ราย) ทั้ง 2 ครั้ง มีสาเหตุจากหมูชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งสา อำเภอป่าปาย (10 ราย) สาเหตุจากหมูชาวเขาที่อำเภอเมือง (8 ราย) เป็นชาวกะเหรี่ยง จากชายแดนไทย – พม่า

ภาคกลางมีผู้ป่วย 2 ราย จากตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ สาเหตุจากหมูป่า ซึ่งท้องที่นี้เคยมีการระบาดของโรคทริคิโนซิส เมื่อปี พ.ศ. 2531

ภาคใต้มีผู้ป่วย 84 ราย ที่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี สาเหตุจากหมูป่า การเกิดโรคครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของจังหวัดชุมพร โดยครั้งแรกเกิดที่ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ มีผู้ป่วย 3 ราย เมื่อปี พ.ศ. 2532

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (2526 – 2535) มีผู้ป่วยด้วยโรคทริคิโนซิส รวม 2,842 ราย ตาย 10 ราย โดยพบผู้ป่วยมากที่สุด (557 ราย) ในปี พ.ศ. 2526 และน้อยที่สุด (67 ราย) ในปี พ.ศ. 2534 โรคนี้พบในภาคเหนือเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดอุทัยธานี พิจิตร และสุโขทัย จังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเกิดขึ้นเกือบทุกปี คือจังหวัดเชียงราย น่าน และเชียงใหม่ สัตว์ที่เป็นสาเหตุนำโรค ส่วนใหญ่มาจากหมูชาวเขา และหมูป่า ยกเว้นที่ปราจีนบุรี สาเหตุจากตัวตะกวด และที่ชุมพร สาเหตุมาจากเต่าบก