

ทริคิโนซิส (Trichinosis)

ปี 2537 กองระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคทริคิโนซิสจากบัตร (รง.506) จำนวน 183 ราย เสียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.31 ต่อประชากรแสนคน เป็นรายงานจากจังหวัดทางภาคเหนือ 3 จังหวัดคือ เชียงใหม่ 97 ราย ลำปาง 76 รายและพิษณุโลก 1 ราย และจากภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร 9 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากรเป็นรายจังหวัดเท่ากับ 6.27 , 9.46 , 0.12 และ 2.10 ตามลำดับ

ผู้ป่วยแยกเป็นเพศชาย 110 ราย หญิง 73 ราย เป็นอัตราส่วนชายต่อหญิง 1.5 : 1 ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76) อยู่ในวัยทำงานอายุระหว่าง 15-44 ปี แต่พบผู้ป่วยมากอยู่ใน 2 กลุ่มอายุ 25-34 ปี จำนวน 62 ราย และกลุ่มอายุ 35-44 ปี จำนวน 52 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อแสน 0.57 และ 0.68 ตามลำดับ ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดอยู่ในท้องถิ่นชนบท สภาพการรักษาผู้ป่วยร้อยละ 93 ราย เป็นคนไข้ นอกอาการไม่รุนแรง มีเพียงร้อยละ 7 (11 ราย) ที่มีอาการหนัก แพทย์ต้องรับตัวไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน

ท้องที่และสาเหตุของการเกิดโรค ที่จังหวัดลำปาง พบผู้ป่วย 76 ราย ที่หมู่ที่ 7 ตำบลพริก สาเหตุจากเนื้อหมูป่า เมื่อเดือนมิถุนายน ต่อเนื่องไปจนถึงกลางกรกฎาคม 2537

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง เมื่อกลางเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2537 สาเหตุมาจากเนื้อหมูป่า

จังหวัดพิษณุโลก มีรายงานผู้ป่วย 1 ราย ในเดือนกันยายน 2537 ไม่มีรายละเอียดการสอบสวนโรค

จังหวัดชุมพร พบผู้ป่วย 9 ราย ในเดือนมกราคม 2537 ที่หมู่บ้านพันวาน 3 และพันวาน 5 หมู่ที่ 2 ตำบลรับร้อ อำเภอท่าแซะ ดิถขายแคนพม่า สาเหตุจากการรับประทานเนื้อหมูป่าที่ชาวบ้านยังได้จากเทือกเขาใกล้ๆ กับหมู่บ้าน การระบาดครั้งนี้เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา ร่วมกับฝ่ายติดต่อสำนักสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชนท่าแซะ ได้ออกไปตรวจสอบโรคในพื้นที่ พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 158 ราย (ซึ่งไม่มีรายละเอียดในรายงานนี้) การระบาดของโรคทริคิโนซิสครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2 ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ ในหมู่บ้านใกล้เคียงกับการระบาดครั้งนี้ มีผู้ป่วย 3 คน สาเหตุจากชาวบ้านรับประทานย่ำเนื้อเต่า(บก)

แบบดิบๆสุกๆ ครั้งที่ 2 ที่หมู 4 ตำบลเข้าค่าย อำเภอสวี เมื่อปี 2535 มีผู้ป่วย 84 ราย สาเหตุจากการรับประทานลาบเนื้อหมูป่าดิบๆสุกๆ

ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา (2527-2536) พบผู้ป่วยด้วยโรคทริคิโนซิสทุกปี 2535 พบผู้ป่วยสูงที่สุด 397 ราย (0.69 ต่อประชากรแสนคน) และน้อยที่สุดในปี 2533 พบผู้ป่วยเพียง 67 ราย (0.12 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเกิดขึ้นในภาคเหนือมีเพียง 3 ครั้ง ที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรี 1 ครั้ง และที่ชุมพร 2 ครั้ง สำหรับผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ในรอบ 10 ปี พบว่าลดลงมากเหลือเพียง 8 ราย จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 2,459 ราย (อัตราป่วยตาย 0.32%) ทั้งนี้ น่าจะมาจากการดูแลรักษาผู้ป่วยดีขึ้น