

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)

ในปี พ.ศ. 2544 สำนักระบาดวิทยา ไม่ได้รับรายงานโรคทริคิโนซิสในคนเกิดขึ้นเลยในประเทศไทย นับเป็นปีแรกในรอบ 20 ปี ที่ไม่มีผู้ป่วย / ตาย ด้วย โรคนี้ ในช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2543 มีผู้ป่วยสูงสุด 397 คน ในปี พ.ศ. 2535 และน้อยที่สุด 16 คนในปี พ.ศ. 2542 แต่มีผู้เสียชีวิตน้อยมาก เพียงปีละ 1 ราย หรือไม่มีผู้เสียชีวิตเลย อัตราการป่วยอยู่ระหว่าง 0.30 – 0.69 ต่อประชากรแสนคน ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับโรคเชื้ออย่างอื่น อย่างไรก็ตามโรคนี้อาจเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจได้ หากการเกิดโรคเข้ามาอยู่ในวงจรฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนสุกรมาก ๆ ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกิจการส่งออกอยู่ด้วย

ปกติโรคทริคิโนซิสมักจะเกิดขึ้นในสุกรของชาวเขาที่เลี้ยงของชาวเขาที่เลี้ยงปล่อย คดยให้ อาหารเช้า – เย็น ส่วนกลางวันออกหากินเองตามป่าเขารอบ ๆ บ้าน

พบบ่อย ๆ เฉพาะบางจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศ เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ เพชรบูรณ์และน่าน ภาคกลางเคยพบที่จังหวัดกาญจนบุรี และปราจีนบุรี ส่วนภาคใต้เคยพบที่จังหวัดชุมพร เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับรายงานเฝ้าระวังโรครายเดือนของกองระบาดวิทยา ที่เคยรายงานโรคนี้ไว้หลายฉบับตอนต้น ๆ ปี โดยเฉพาะจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้รายงานได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากความผิดพลาดเกี่ยวกับรหัสโรคที่ไม่ใช่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคนี้ จึงได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงตามความเป็นจริงในสรุปรายงานเฝ้าระวังโรคประจำปีแล้ว