

โรคทริคิโนซิส (Trichinosis)

ในปี พ.ศ.2551 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคทริคิโนซิส จำนวน 44 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วย 0.07 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีรายงานการเกิดโรคทริคิโนซิส 0.10 ต่อประชากรแสนคน (รูปที่ 1) ทั้งหมดเป็นรายงานจากภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ 36 ราย แม่ฮ่องสอน 7 ราย และเชียงราย 1 ราย อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 2.16, 2.76 และ 0.08 ตามลำดับ (รูปที่ 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายงานการเกิดโรคติดต่อกัน 3 ปี ส่วนจังหวัดเชียงรายมีรายงานการเกิดโรคติดต่อกัน 2 ปี

พบผู้ป่วยเพศชาย 33 ราย เพศหญิง 11 ราย อัตราส่วนชายต่อหญิง 3 : 1 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 25-34 ปี และ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วยเท่ากัน 0.10 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยจำนวน 11 รายและ 5 ราย ตามลำดับ รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 35-44 ปี และ 45-54 ปี อัตราป่วยเท่ากัน 0.09 ต่อประชากรแสนคน ผู้ป่วยจำนวน 10 รายและ 8 ราย ตามลำดับ อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด คือ เกษตรกร 31 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดอาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน 43 ราย และสถานอนามัย 1 ราย

พบการระบาดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และ กันยายน เดือนกุมภาพันธ์มีผู้ป่วยมากที่สุด 36 ราย (รูปที่ 2)

ปี พ.ศ.2551 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานการสอบสวนโรคจากจังหวัดเชียงใหม่ พบการระบาดที่อำเภอแม่แจ่ม

บ้านแม่หางานหลวง และบ้านขอมใต้ ตำบลปางหินฝน พบผู้ป่วยจำนวน 45 ราย เพศชาย 32 ราย หญิง 13 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 2.5 : 1 ผู้ป่วยมีอายุระหว่าง 3-85 ปี ผู้ป่วยรายแรกเริ่มป่วยวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 รายสุดท้าย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ ไข้ ปวดศีรษะ ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดบวมบริเวณใบหน้าและลำตัว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้ออ่อนแอ หน้าตาบวม ผลการสุ่มตรวจ เม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิล ในผู้ป่วยสูง สาเหตุการระบาดเกิดจากการนำสุกรจากบ้านสะมอจากบ้าน ตำบลแม่ศึก มาฆ่าและแบ่งกันในหมู่บ้าน และนำมารับประทานอย่างสุกๆ ดิบๆ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าไปตรวจสอบสุกรจากแหล่งซื้อ และเก็บตัวอย่างซีรัม พบสุกรในพื้นที่ให้ผลบวกต่อโรค พร้อมทั้งให้ยาถ่ายพยาธิในหมู่บ้านดังกล่าวแล้ว

สถานการณ์การเกิดโรคทริคิโนซิสในปี นี้ สาเหตุการเกิดโรคไม่แตกต่างจากปีที่แล้ว คือ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับประทานเนื้อสุกรหรือเนื้อสัตว์ป่าสุกๆ ดิบๆ

สรุป จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคทริคิโนซิสในปี พ.ศ.2551 จากการเฝ้าระวังเชิงรับ และการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active case finding) มีผู้ป่วยรวม 53 ราย

ผู้เรียบเรียง

ธีรศักดิ์ ชักนำ สำนักระบาดวิทยา



